

《保護者の方のご記入をお願いいたします》

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団での発症や流行をできるだけ防ぐことはもちろん、子どもたちが一日快適に生活出来ることが大切です。感染症については、登園の目安を参考に、かかりつけの医師の診断に従い、登園届の提出をお願い致します。なお、保育所での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮ください。

○ 医師の診断を受け、保護者が記入する登園届が必要な感染症

感染症名	感染しやすい期間	登園のめやす
インフルエンザ	症状が有る期間(発症前24時間から発病後、3日程度までが最も感染力が強い)	発症した次の日から5日経過し、かつ解熱した後3日経過してから
マイコプラズマ肺炎	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後、数日間	発熱や激しい咳が治まっていること
新型コロナウイルス	発症2日前から発症後5日間(発症後3日間は特に感染力が高い)	発症した次の日から5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過してから *1
手足口病	手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること
伝染性膿痂疹(とびひ)	水疱、膿疱があり患部がじくじくしている間	皮疹面が乾燥してから
溶連菌感染症	適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間	抗菌薬内服後24時間以上経過していること
ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること
RSウイルス感染症	呼吸器症状のある間	呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと
流行性角結膜炎(はやり目)	充血、目やに等症状が出現した数日間	感染力が非常に強いいため結膜炎の症状が消失してから
咽頭結膜熱(プール熱)	発熱、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え2日経過してから
急性出血性結膜炎	ウイルスが呼吸器から1~2週間、便から数週間~数か月排出される	医師より感染の恐れがないと認められるまで

\*1 症状軽快とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態

きりとりせん

**登園届(保護者記入)**

ちがせ保育園 園長殿

園児名 \_\_\_\_\_

受診日      年      月      日

医療機関名「 \_\_\_\_\_ 」において

病名「 \_\_\_\_\_ 」と診断されましたが

病状が回復し 年      月      日より集団生活に支障がない状態と診断されましたので登園します。

年      月      日

保護者名 \_\_\_\_\_